

WYKAZ PTAKÓW TATRZAŃSKICH

NA PODSTAWIE

własnych i obcych spostrzeżeń.

SKREŚLIŁ

JUSTYN KARLIŃSKI,

student medycyny.

Osobne odbicie ze Spraw. Komisji fizyograficznej Akademii umiej., tom XVI.


W KRAKOWIE,
W DRUKARNI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
pod zarządem Ignacego Stelcła.

1882.



48170
II

Biblioteka Jagiellońska



1002985125

Wykaz ptaków tatrzańskich

NA PODSTAWIE

WŁASNYCH I OBCYCH SPOSTRZEŻEŃ

skręślił

JUSTYN KARLIŃSKI

stud. med.



Zabierając się do skręślenia niniejszego wykazu ptaków tatrzańskich, winienem choć po krótko usprawiedliwić powstanie niniejszej pracy. Spostrzeżenia nad ptasznją tatrzańską ogłosili: Hr. KAZIMIERZ WODZICKI w swém dziełku p. t.: „Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty galicyjskie na początku Czerwca 1850 r.“ wydaném w Lecznie 1851 r. P. E. SCHAUER b. kustosz zbiorów uniwersyteckich w rozprawie swėj p. t.: „*Tagebuchsnotizen während eines ornithologischen Ausfluges auf der hohen Tatra in den Monaten Juli und August 1861*“ ogłoszonėj w „*Cabannis Journal für Ornithologie*“ 1862, wreszcie Prof. Dr. NOWICKI w pracy swėj: „Przegląd prac dotychczasowych o kręgowcach galicyjskich“ podał wszystkie daty zebrane przez poprzednich badaczów nad ptasznją tatrzańską.

W lecie 1881 r. bawiąc za zasiłkiem Komisyi fizyjograficznėj Akademii Umiejętności w Tatrach, celem zebrania tamtejszych wjów, szczególniejszą przy tém zajęciu zwracałem uwagę na ptaki, chcąc stwierdzić obecność wymienionych w poprzednich pracach gatunków w miejscach rozmaitych, w jakich wśród wycieczek ciągłych się znajdowałem. Z skrzętnych poszukiwań i notatek powstał niniejszy wykaz, z badań nad życiem ptaków moje: „Obrazki z fauny tatrzańskiej“ drukowane w „Przyrodniku“ r. 1881 i 1882.

Bawiłem w Tatrach od pierwszych dni Lipca do końca Sierpnia, w wycieczkach mych środkowe i wschodnie przeważnie obszedłem Tatrę, dotykając tylko w dalszych wycieczkach zachodnich wysoczyzn.

Trzydzieści lat oddziela mnie od badań hr. WODZICKIEGO, dwadzieścia od badań p. SCHAUERA, a czas ten nie mało wpłynął na zmianę stosunków pod Tatrami ¹⁾.

Zajmując się od dawna chowem ptaków i badaniem ich życia, nabyłem pewnej wprawy w rozpoznawaniu gatunków w rozmaitem upierzeniu stósownie do pór roku, wieku i rodzaju, ztąd też lubo w obecnych stosunkach nie mogłem sam zdobywać potrzebnych okazów, w części Tatr zostającej w ręku obcokrajowych posiadaczy, zdołałem mimo to rozpoznać gatunki, które niżej wymieniam, a skuteczniezałem to w ten sposób, iż nieraz długo i ostrożnie skradać się musiałem, by rozpoznać należycie okaz, wiele wypytywać się i porównywać, oraz starania robić za dostaniem takowegoż, zanim na zamieszczenie w niniejszym wykazie zdobyć się mogłem. Nadto wspierali me poszukiwania zamieszkali u podnóża Tatr, a długoletnim w tych stronach pobytem, wykształceniem swém i praktyką zupełną dający mi rękojmię mężowie jak PP. KOCYAN, PAWLICA i V. FINGER.

Najwięcej dat co do pobytu i spostrzeżeń zawdzięczam p. KOCYANOWI leśniczemu w Orawicach na Orawie, który od 30 blisko lat osiadły w tych miejscach, z zamięłowania zbiera okazy fauny krajowej, przedewszystkiém ptaki, w czasie swego pobytu nie jedno odkrycie, nie jedno ciekawe a wiarygodne zrobił dostrzeżenie, nie jedno muzeum zoologiczne wzbogacił okazami z fauny tatrzańskiej tak w kraju jak za granicą i sam wielki zgromadził sobie zbiór ptaków, należycie przyrządzonych i oznaczonych. Rezultatami jego badań nieraz posługiwali się piszący o faunie krajowej, w pismach zagranicznych nie jeden oddaje mu zasłużoną cześć. Nie mogąc dostatecznemi wykazać się okazami z przyczyn wyżej wymienionych, na poparcie słów mych powołać się niejednokrotnie muszę na okazy w zbiorze jego znajdujące się, w wielu miejscach na jego światłą radę i uwagi się powołać.

Nie mniejszą wdzięczność winienem drugiemu przyjacielowi memu p. FR. PAWLICY, leśniczemu w dobrach Szaflarskich (w Poroninie), którego łaskawości zawdzięczam to, że w terytoryjum jego bez przeszkody badania me prowadzić mogłem, jego podwładni najlepszymi byli mi przewodnikami i nie jedną uwagą poprzeć mógł me dostrzeżenia.

Trzeciemu z kolei p. FINGEROWI adjunktowi leśnictwa w Zakopaném, zawdzięczam wiele uwag co do czasu pojawów ptactwa, które jako myśliwy i dobrze z fauną krajową obeznany udzielić mi był łaskaw.

¹⁾ Hr. WODZICKI w dziełku swém zestawil razem ptaki tatrzańskie z karpaczkimi. Rozdział tedy ptaków tych był konieczny. A o ilem się przekonał, mają Tatry sobie właściwe gatunki, nieznachodzące się w Karpatach galicyjskich; przez zestawienie tedy takie, jakie się w dziełku hr. W. znachodzi, możnaby błędnego o ptasznictwie tatrzańskiem nabrac przekonania. — Pan SCHAUER zaś dziełko swe pisał sposobem dziennika, bez żadnego układu, tak iż jest to raczej sprawozdanie myśliwskie, co zretztą już sam tytuł usprawiedliwiał.

Przy uprzejmiej pomocy ze strony tych Panów poznałem ptasznę tatrzańską przytoczoną w niniejszym wykazie, a na tém miejscu zaznaczyć mi wypada, o ile wykaz ten różni się od prac poprzednich badaczy. Otóż do dotychczasowych przybývają: *Milvus regalis*, *Circus rufus*, *C. cyaneus*, *Strix acadica*, *Corvus frugilegus*, *Coracias garrula*, *Lanius minor*, *L. collurio*, *Muscicapa parva*, *Salicaria palustris*, *Picus leuconotus*, *P. minor*, *Alcedo ispida*, *Columba turtur*, *Charadrius pluvialis*, *Numenius arquatus*, *Gallinula chloropus*, *G. pusilla*, *Tringa alpina* i *Anas querquedula*. — Z wykazów zaś dotychczasowych jestem za usunięciem: *Vultur fulvus*, *Haliaetus albicilla*,¹⁾ *Bubo scops*, *Strix uralensis*, *Pyrhacorax pyrrhacorax*, *Turdus atrogularis*, *Ficedula hipolais*, *Luscinia philomela*, *Alauda ulpestris*, *Emberiza nivalis*, *Loxia pythiopsittacus*, *Pyrrhula enucleator*, *Junx torquilla*, *Lagopus alpinus*, *Perdix saxatilis* oraz *Fringilla petronia*, co zresztą na właściwem wykazane jest miejscu.

Co do nazw miejscowości w wykazie tym wspomnianych trzymałem się: Nowego przewodnika do Tatr WALEREGO ELIJASZA, mapy prof. KOLBENHAYERA i generalnego sztabu austrijackiego. Co do nomenklatury zoologicznej dziełka hr. DZIEDUSZYCKIEGO p. t.: Muzeum Imienia Dzieduszyckich. Tom I. Ptaki ¹⁾.

Rapaces diurni — Drapieżne dzienne.

1. *Vultur cinereus* Gmel. Sęp kasztanowaty. Tyz. Ptak ten zauważany przez hr. WODZICKIEGO i p. E. SCHAUERA, pojawia się zdaniem osób mieszkających stale pod Tatrami, jak p. KOCYANA, PAWLICY i V. FINGERA tylko przypadkowo—na wiosnę zaś lub w jesieni w stadkach 3—5 głów liczących; jeżeli więc hr. WODZICKI w swym wykazie ptaków zalicza go do ptaków osiadłych, zdanie to wymagałoby faktycznego stwierdzenia. W roku ubiegłym był nawet dość rzadki. Podczas pobytu mego spotkałem go w ogóle dwa razy. Raz na polanie Waxmundzkiej, drugi raz przy stawach gąsienicowych, dość nisko przelatującego. W zbiorze p. KOCYANA w Orawicy znajduje się samica zabita w Tatrach. W wykazie hr. WODZICKIEGO wymienionym jest jeszcze: *Vultur fulvus* Lin. Sęp płowy Tyz. Ptaka tego ani nie spotkałem, ani wiadomości pewnych zasięgnąć nie mogłem, czy się kiedy

¹⁾ Świeżo nakładem Akademii Umiejętności wydane dzieło WŁADYSŁAWA TACZANOWSKIEGO, miałem sposobność przeglądać dopiero po napisaniu i oddaniu do druku pierwszych kart niniejszej pracy. Nomenklatury polskiej i łacińskiej przezeń użytej z tegoż powodu nie użyłem; nadto autor nie uwzględnia nomenklatury poprzednich badaczy, a nawet częściowo téj, jaką w poprzednich użył pracach swych i każdemu gatunkowi właściwego wymysłu nazwę daje—co niemało do zamieszania już i tak widocznego w dziełach zoologicznych polskich się przyczynia.

pojawia. Owszem p. KOCYAN, wyborny znawca ptaków, doniósł mi, że ptaka tego zupełnie przez ostatnie 30 lat nie widział. Nie umieszczam go tedy w niniejszym wykazie ptaków zamieszkujących Tatry lub stale się pojawiających. Znam go tylko z okolic Krakowa, 3 czy 4 razy spotykałem go, dość łatwy zresztą po płówem upierzeniu spodu ciała do odróżnienia od sępa kasztanowatego. Hr. WODZICKI wspomina o gnieźdzeniu się jego w Tatrach gdzieś na górze Hurus (?) nad Morskim Okiem. Prof. Dr. NOWICKI w swym „Przeglądzie prac dotychczasowych o Kręgowcach krajowych“, oparłszy się na wyjaśnieniu daném przez p. E. SCHAUERA, zaprzecza gnieźdzeniu się sępów w Tatrach i Beskidzie.

2. *Aquila fulva* Pall. Orzeł przedni Wodz. Wymieniony w spisach ptaków tatrzańskich, żyje i gnieździ się w Tatrach bądź na drzewach wysokich, bądź w turniach. Gniazdo opuszczone, wnioskuje po sterówkach poronionych, doń należące spotkałem w jednym z załomów skały na zachodnim szczycie Bystrzej w dolinie Kościeliskiej. Gniazdo na drzewach, jak to widzieli poprzedni ornitologowie tatrzańscy, nie spotkałem. W locie łatwy do odróżnienia od następnego gatunku: spodem ciała białawym i ogonem z czarną pręgą końcową. Spotkałem go na polach Poronina, przy Wołoszynie, przy Świnnicy i w dolinie Wierchcichej. Zdaniem osób wyż wymienionych i strzelców tatrzańskich, zimową porą zlatuje do dolin. Z tego com widział nie mogę wnosić, jak to p. SCHAUER czyni, czy w reglach przeważnie żyje, czy też w turniach. Oba tak podobne sobie gatunki Orła Złotego i O. przedniego spotykałem zarówno w reglach jak w turniach, i pod tym względem nie pewnego zasięgnąć nie mogłem. Pan KOCYAN posiada 3 okazy z Tatr.

3. *Aquila chrysaetos* Brehm. Orzeł Złoty Wodz. Ptak ten raczej za odmianę niż za gatunek osobny uważany, spostrzegany przez obu mych poprzedników, zdaniem hr. W. gnieździ się na drzewach; co też p. S. stwierdza w notatce, że widywał go gnieźdzącego się w smereczynach. Sam gniazdo nie widziałem, a strzelcy tatrzańscy różnicy między obu tymi ptakami nie robią. Orła tego spotkałem dwa razy przy samém Zakopanem i w dolinie Kamienistej, zabitego zaś przy Bukowinie.

4. *Aquila naevia* Briss. Orzeł orlik. Myśl. ptasz. (Wodz. Schau. Now.). Gnieździ się w reglach, gdzie go przy hali Ornaku, Hrubym Reglu, Wołoszynie spotykałem. W Tatrach całych ma być nierzadki.— Zabitego widziałem w Zakopanem. Według p. PAWLICY przebywa w reglach od Maja do Września, według prof. Dra NOWICKIEGO od Kwietnia do Października.

5. *Pandion Haliaetus* Cuv. Rybołów rzeczny Tacz. (Wodz. Now.). Ptak ten według pierwszego na ciągu jesiennym nad Dunajcami widywany, zjawia się jesienią w Tatrach, już w końcu Sierpnia spotkałem go nad Białką, nad Dunajcem, przy Poroninie i Nowym Targu. W zbiorze p. KOCYANA znajduje się jeden okaz. Gatunek ten stwierdziłem na okazie zabitym nad Białą Wodą w dolinie tejże nazwy. Zabity 2 Sierpnia przez strażnika lasowego.

Wymienionego przez hr. W. i prof. NOWICKIEGO: *Haliaetus Al-bicilla* Leach. Birkuta Bielika nie widziałem nigdzie w Tatrach, brak jezior rybnych niższych jest tego powodem. P. KOCYAN posiada okaz z Orawy, lecz zdaniem mojem i osób wyżej wymienionych pojawy jego są tylko czysto przypadkowe. Omijam go tedy w tym wykazie.

6. *Circaetus gallicus* Vieil. Krótkoszypon gadżer. Pietr. Hr. WODZICKI zamieszcza go niepewno w Tatrach, p. SCHAUER spotykał w Beskidzie. Ptak ten znany strzelcom we wschodnich Tatrach; gnieździ się w niższych górach, przy Bukowinie, roku zeszłego niezrządki. U P. KOCYANA znajduje się okaz jeden; spotkałem go i rozpoznałem po polyskującym w fioletowy kolor grzbiecie i spodzie białym z strzałkami brunatnymi, o 3 widocznych pręgach na ogonie, z bardzo małej odległości raz na Łysěj polanie 20 Sierpnia 1881, dwa okazy przy Hali Smytněj. Ptak ten dobrze mi znany z doliny Ojcowskiej w Królestwie Polskiem, gdzie się gnieździ, jak to już hr. WODZICKI zauważył.

7. *Falco tinnunculus* Linn. Sokół pustulka Rzą. (Wodz. Sch. Now.). Pospolity w Tatrach przy górnej granicy lasów i w turniach, gdzie się gnieździ. Gnieźdzącego się widziałem na Kasprowej, Wołoszynie, Łysankach, Krywanu; jeden okaz zabiłem w Olczysku, u p. KOCYANA okazów dwa. Bawi w górach od Kwietnia do Października według p. PAWLICY i FINGERA; według prof. Dra NOWICKIEGO do Września. Na zimę zlatuje w równiny ku południowi.

Na polach wsi „Zakopane“ spotkałem 16 Lipca 1881 r. parkę sokołów, które po dokładnem a blizkiem rozpatrzeniu się (było to bowiem na brzegu lasu przy Krupówkach) okazały się być parką *Falco rufipes* Besecke. Sokół kobczyk Tacz. Ponieważ jednak nikomu u podnóża Tatr nie jest znany, a p. KOCYAN tylko jeden okaz ♂ posiada, nie mogę go wspólnie z poprzednikami mymi do ptasznictwa tatrzańskiego zaliczyć; notuję tylko fakt niezawodnego pojawiania się tego ptaka w naszych górach.

8. *Falco lanarius* Linn. Sokół raróg Mysl. ptasz. (Wodz. Sch. Now.). Według pierwszego ma być tylko na węgierskiej stronie Tatr, według drugiego w reglach. Przebywa jednak i w turniach; spotkałem bowiem w Lipcu na Wołoszynie, w początku Sierpnia na Goryczkowej, w końcu Sierpnia na Krzesanicy i Tomanowej liptowskiej pojedyncze okazy. O gnieźdzeniu się jego nie mam wiadomości pewnych, jakkolwiek mnie o tém przewodnik WALA, znający dobrze kręgowce tatrzańskie, zapewniał. U p. KOCYANA jest okaz jeden.

9. *Falco peregrinus* Linn. Sokół wędrowny Tyz. (Wodz.) Ma omijać według hr. WODZICKIEGO góry galicyjskie. Spotkałem go na Krywanu, Bystrzej w Sierpniu, za Świnnicą w Lipcu, wszystkiego okazów 5; w niższych górach nigdzie. W zbiorze p. KOCYANA znajduje się jeden pochodzenia tatrzańskiego. W naszych górach się nie gnieździ. O gnieźdzeniu się w skałach Ojcowa mam wiadomość.

10. *Falco subbuteo* Linn. Sokół kobuz Rz. (Wodz.). Zgodnie z poprzednikiem moim zauważyć muszę obecność jego przy niższych

górach i lasach, gdzie się gnieździ. Kilka okazów spotkałem i na małą odległość rozpoznałem w reglach Nosala, na polach Olezy; przy Murzasichlu oglądałem zabity okaz również i przy Bukowinie, pokazywany mi jako „Myszołów“ przez leśnego. Z tych samych powodów co *Fulco rufipes* nie mogę zamieścić w niniejszym spisie i *Fulco aescalon* Lin. Sokół drzemlik Mysl. ptasz. Poznałem bowiem w spotkanym przy końcu Sierpnia przy Poroninie sokole po modro popielatym płaszczu, z wyraźnymi czarnymi stosinami, popielatym wierzchu głowy, popielato-rdzawym karku i rdzawych nogawkach, starego samca z tegoż gatunku. Nie mogąc zasięgnąć jednak pewnych wiadomości, mimo że jeden okaz ♂ znajduje się w zbiorze p. KOCYANA, za ptaka tatrzańskiego uważać go nie mogę.

11. *Pernis apivorus* Luk. Pszczołojad pospolity. Tacz. (Wodz. Sch.). Przebywa w reglach, mało znany strzelcom tatrzańskim. Dwa okazy spotkałem przy Furkotówkach, jeden przy Łysěj polanie, jeden przy Toporowym stawie, jeden dostałem zabity w połowie Lipca w Kuźnicach Zakopiańskich; na tym stwierdzić mogłem i gatunek i wiek. Przy końcu Sierpnia już go nigdzie nie spotykałem. U p. KOCYANA znajduje się samica pochodzenia tatrzańskiego.

12. *Buteo vulgaris* Vieil. Myszołów pospolity Tyz. (Wodz. Now.). Pospolity przez całą wiosnę, lato i jesień u podnóża Tatr, szczególnie na polach wyżej położonych jak Gubałówka, Murzarichle, Poronin. W miejscach tych widywałem na małej przestrzeni po kilka okazów pożytecznych tych ptaków, polujących na myszy i norniki.— Nie brak go i w dolinach tatrzańskich jak Mała Łąka, Kościeliska, gdzie się w reglach gnieździ. Według opowiadań strzelców tatrzańskich i uwagi łaskawie mi przez p. PAWLIĘ zrobionj, dość częste są przypadki zimowania tego ptaka przy mieszkaniach ludzkich. Przy Jaszczerówce znalazłem zabity okaz, kilku pręgami białymi przez brzuch i piersi oznaczony, mocno nadpsuty. Kilka okazów spotkanych w Małej Łące różną porą, miało w upierzeniu swém odcień białawy, tak że całość dość odmiennie się przedstawiała, na okazie jednak stwierdziłem zaraz gatunek. Okaz ten mocno zestrzelany dostarczył mi leśny GRONIKOWSKI. W zbiorze p. KOCYANA znajduje się kilka okazów rozmaitej płci i wieku.

13. *Buteo lagopus* Brünn. Myszołów włochaty Tacz. (Wodz. Sch.). Według pierwszego pod zimę w góry zalatuje; trafiają się jednak okazy w Sierpniu jak ten, który zastrzelono na Krzeptówkach i który oglądałem. Był to stary samiec, bez 3 stérówek; co szczególniejsza, brzuch miał zupełnie brunatny jak samica tego gatunku i palce żółte. Nie gnieździ się w Tatrach i w ogólności dość rzadki. Jak mnie zapewniano, pojawia się wprawdzie co roku, bawi przez zimę i z wiosną odlatuje, co już i TACZANOWSKI („O ptakach drapieżnych“ str. 78) zauważył.— W obec tego dziwną mi się wydaje uwaga w rozprawie prof. Dra NOWICKIEGO, gdzie przy tym gatunku zanotowano, że bawi od Marca do Października — raczej odwrotnie.

14. *Astur nisus* Blas. Jastrząb krogulec Wodz. (Wodz.). W dolinach tatrzańskich nierzadki. Gnieździ się w reglach n.p. na Wołoszynie; posuwa się w połowie swym za zębami i inném ptactwem aż ponad kosodrzewinę, jak na zboczach Gewontu i Kopy Kondrackiej, gdzie często kilka okazów naraz widywałem. Zabitego widziałem na Cichém, z tegoż lotki i stérówki posiadam.

15. *Astur palumbarius* Lacep. Jastrząb gołębiarz. Wod.—Gołębiarz lud. (Wod. Sch.). Pospolity ten rabuś gnieździ się w reglach; nie brak go w dolinach i polanach tatrzańskich, pospolity przy brzegach lasów. Gnieźdzącego się widziałem w Pardołowce, Kościeliskiej dolinie; zabitego w Kuźnicach Zakopiańskich.

16. *Milvus regalis* Brehm. Kania wielka. Myśl. ptasze.—Nie zaliczona w poczet ptaków pod i w Tatrach żyjących. Żyje jednak jak to na kilku okazach stwierdzić mogłem na błotach Furtackich przy Kośnym Hamrze, oraz na polach do Olczy należących; czy się gnieździ, nie wiem. Okazy były stare, wyrosłe, a jak mnie zapewniali strzelcy dóbr Szaflarskich, w niektórych latach tak pospolite, jak Myszołów, o czém pozwałam sobie jednak powątpiewać. P. KOCYAN posiada jeden okaz z Orawy.

17. *Circus rufus* Briss. Błotniak błotny Jundził. równie jak

18. *Circus cyaneus* Blas. Błotniak zbożowy Tacz. nie jest wymieniony w dotychczasowych wykazach; obecność ich miałem sposobność stwierdzić. Błotniaka błotnego podszedłem na torfowiskach przy Kośnym Hamrze niemal na kroków 5 i miałem się czas należyście przypatrzyć ¹⁾. Drugiego spotkałem tylko na Spiżu, na polach przy Jaworzynie Spiskiej, gdzie leśny towarzyszący mi na polanie Białej Wody pokazał mi kilka okazów zabitych przez siebie: Pustułek, Myszołowa i jeden okaz w rocznem piérzu z tegoż gatunku. O gnieźdzeniu się i pojawach objaśnić mnie nie umiał, a bardzo żałuję, że okazem

¹⁾ Okaz ten był starym samczykiem o białawym wiérzchu głowy, twarzy szarój z białawą szlarą, karku brunatnego, takimże grzbiecie i pokrywach skrzydłowych; szyi i piersi białej, ogonie płowo popielatym, od spodu prawie biały. Najlepiej wskazuje sposób lotu „*cujus generis*“ jest ptak. — Lot bowiem Błotniaków tak różny od sokołów i jastrzębi, jest nadzwyczaj lekki, wahający, jak to słusznie Taczanowski zauważył do rybitwy lub mewy podobny.

Błotniak zbożowy młody, osobliwie piérwszoroczny, trudno może być pomieszany z innym gatunkiem. Brunatny z wiérzchu, brew i potylicowa plamka płoworuda, spód jaskrawo rudy, stérówki popielato-brunatne, z 4ma pręgami, skrajne stérówki prawie rude, lotki czarniawe, od spodu szare z brunatnemi strzałkami. Gatunek ten tém znajomniejszy mi, że przez lat kilka chowałem w domu na uwieczni młodego: mogłem się tedy i zmianie barwy i życiu przypatrzyć, a w latach ostatnich przynajmniej 20 — 30 sztuk tych ptaków przeszło mi przez ręce; dość zatem poznałem odmian ich barw, którym wspólnie z myszołowami ulegają. — W wykazach mych poprzedników, ptaków tych nie ma wymienionych — może późniejsze badania coś więcej o pojawach ptaków tych doniosą.

pięknym podania gatunku tego stwierdzić nie mogę. P. KOCYAN w zbiorze swym posiada z obu tych gatunków po parze pochodzenia tatrzańskiego.—O błotniaku błotnym nie umiano mi również w Poroninie nic więcej powiedzieć, jak tylko że na błotach i łąkach zawsze w lecie spotkać go można.

Rapaces nocturni. — Ptaki drapieżne nocne.

19. *Bubo maximus* Rauz. Puhacz właściwy Tacz. (Wodz.). Gnieździ się i przebywa w reglach. Jeden okaz spłoszyłem przy skale Filipczańskiej, drugi zabito przy parowym tartaku w Zazadniej. Pan PAWLICA posiada okaz piękny przez p. KOCYANA wypchany, pochodzenia tatrzańskiego. Jak mnie strzelcy zapewniali, ptak ten w starszych lasach nierzadki. Pospolity ma być przy Wiktorówkach, w lasach Krywania, tam go jednak mimo poszukiwań nie spotkałem.

20. *Bubo otus* Sav. Puhacz uszaty Tacz. (Wodz.). Puhacz ten o ile z kilku okazów wnosić mogłem, które spotykałem lub zabite widziałem, nie trzyma się granicy jaką hr. WODZICKI mu wyznacza, t. j. 2000'. W reglach Wołoszyna tak dobrze się trzyma jak na Cyrli, Olczysku, Cichem, gdzie mi okaz zabity pokazywano. Gnieździć się ma na skraju lasów, czego jednak nie mogłem stwierdzić. Prócz tych puhaczów zamieścił hr. WODZICKI w swym wykazie i *Bubo scops* (Puhacz syczek). Ptaka tego ani p. SCHAUER, ani ja, ani wreszcie szczegółowe wypytывania się o niego u osiadłych pod Tatrami strzelców i urzędników lasowych obecności wykazać nie mogły, jak również przez tegoż badacza w Tatry przeniesiona Sowa uralaska: *Syrnium uralense*.

O pobycie sowy tej na Beskidzie i Karpatach mam kilka prywatnych wiadomości; w Tatrach jednak sowy tej nie widziano, jakkolwiek p. KOCYAN od lat 30 pilnie ornitologiją się zajmujący, starał się wszelkiemi środkami coś pewnego o jej pojawach zdobyć.

21. *Uluła aluco* Bla. Sowa puszczyk. Jundz. (Wodz. Now.). Według wiadomości, jakie zasięgnąć mogłem, stale przebywa w Tatrach, w reglach i nizinach, głos jej słyszałem nocując na Wołoszynie, przy Cichem, przy Ornaku, w dolinie Kamienistěj i Tomanowej polskiej. Kilka okazów spotkałem, z tych jeden dostarczono mi do przegłównienia w dolinie Kościeliskiej i przy Smereczyńskim stawie, gdzie w starěj jodle miała gniazdo.

22. *Uluła dasypus* Sowa włochatka (Wod. Sch. Now.). Trzyma się gęstych lasów, dobrze krzakami podszytych a według hr. WODZICKINGO sięga 3000' n.p.m. Spotykałem ją w lesie przy Gąsienicowych stawach, przy Roztoce, Gęsiěj szyi; jeden okaz schwytany przy szaleńsie pod Pańszczycą, jeden okaz widziałem w dzień w górnym końcu dolinki „Ku Dziurze“ 3247' n. p. m.

23. *Athene noctua* Boje. Sówka pójdzka. (Wodz. Now.). Zamieszkuje okrajki lasów bliżej osad lub mieszkań ludzkich; widywałem ją przy Jaszczurówce, na Cichem w dolinie Kościeliskiej. Głos jej, nocując po lasach, często w starszych lasach słyszałem n. p. przy Goryczkowej hali. U p. KOCYANA znajduje się okaz jeden. ¹⁾

24. *Athene acadica* Sówka karliczka Jar. Niewymieniona w dotychczasowych spisach. — Zdaniem p. PAWLICY pojawia się prawie corocznie, w ogólności jednak b. rzadka, najwyżej jeden lub dwa okazy zabijano lub spotykano do roku. W lecie r. 1881 widziałem ją i rozpoznałem (według własnych doświadczeń i opisów TACZANOWSKIEGO i TYZENHAUZA) przy bagnach Furtackich; była ranioną lecz odszukaną być nie mogła. Okaz jeden zabity w lasach przy hali Goryczkowej dostarczono mi.

25. *Strix flamea* Linn. Puszczyk płomykowaty Tacz. (Wodz. Now.). Pospolita w okolicy mieszkań ludzkich; gnieździ się przy stodółach i ruinach, n. p. w dolinie Kościeliskiej. Zdarzyło mi się widzieć w Murzasichlu odmianę prawie białą, zabita w stodołę.

Oprócz sów tych w wykazie niniejszym wymienić nie mogłem: *Syrnium nyctea* Kaup. (Sowa biała Jundz.), *Ulula nisoriu* Mey. (Sowa jarzębata Tyz.) i *Bubo brachyotus* (Puhacz błotny. Tacz.). Piérwsza bowiem zjawia się bardzo rzadko na węgierskiej stronie, a to wyjątkowo tylko zabłąka się na kilka dni, druga tylko podczas bardzo ostrych zim; trzeciej z powodu braku rozległych błot w polskiej stronie Tatr prawie nigdy nie spostrzegano. O jednym tylko wypadku zabicia jej na torfowiskach w okolicy Ludźmierza doniesiono mi, a na węgierskiej stronie było wypadków takich kilka. W zbiorze p. KOCYANA wszystkie trzy gatunki są kilkoma okazami reprezentowane ²⁾.

¹⁾ Sówka pójdzka Tacz. w nowém wydaniu ptaków krajowych przez TACZANOWSKIEGO „Sówką“ zwana, spłoszona ciekawo wydaje głos który TACZANOWSKI „cwierkoczącym“ (str. 137) nazywa. W samęj rzeczy o ile zauważyłem, spłoszona wydaje głos bardzo do głosu dziciola zielonego lub siwego podobny, ale znacznie przeciąglej-zy; nie jest też ona tak ostrożną w stosunku do człowieka jak gatunek następny (*Glaucidium passerinum* albo *Athene acadica*), kilka razy dała się podejść popołudniową porą na odległość 3—4 kroków i dopiero zaskrzeczawszy odlatywała, lotem stosunkowo ciężkim, niewytrzymalym. Podczas gdy następny gatunek bardzo trudny do podejścia i zabicia, lata wytrwale i spłoszony lub raniony nader trudny do odszukania; pomyka bowiem żwawo, lata ile możności nad ziemią i kryje się w każdy krzaczek napotkany. Łatwiejsza do podejścia w porze godowej, tu na wabika w lasach około Krakowa nieraz ją spotykałem i z bliska oglądać mogłem. Gatunek ten na Orawie musi być rzadki, skoro p. KOCYAN posiada okaz jeden z Tatr galicyjskich i donosi mi, że i tu nader rzadko ją spotykał.

²⁾ Co do *Bubo brachyotus* donosi mi p. KOCYAN, iż w okolicy Nowego Targu, Czarne Dunajca i w ogóle w Podhalu nierzadki, w lasy tatrzańskie nie zapuszcza się jednak wcale i tu go w zupełności *Bubo otus* zastępuje.

Omnivores. — Żarłoczne.

26. *Corvus Corax* Linn. Kruk właściwy (Wod. Sch.). Siega po górną granicę lasów a nawet w kosodrzewinę. Spotkałem go nawet w turniach Wołoszyna, przy Polskim Grzebieniu i przy Babich Nogach (6742' n. p. m.). Nie brak go po lasach i polach Podhala. Hr. WODZICLI spotykał go gnieźdzącego się w turniach jeszcze w miesiącu Czerwcu. P. SCHAUER spotykał go także na szczytach.

27. *Corvus cornix* Linn. Kruk wrona Rz. (Wodz. Sch.). Pospolita na polach i lasach niższych. Spotykałem ją jeszcze w dolinie Kamienistój i przy Gąsienicowych stawach ¹⁾.

28. *Corvus frugilegus* Linn. Kruk gawron Rz. Zimą pospolity na polach w towarzystwie wron i kawek. Pojedyncze okazy widywałem już w Sierpniu na polach Poronina; jeden okaz postrzelony bez kilku lotek z białymi barkówkami widziałem przy Nowym Targu.

29. *Corvus monedula* Linn. Kruk kawka Rz. (Wodz.). Pospolita przez cały rok na polach Zakopanego i Poronina; wielkie stado z głośnym krzykiem widziałem przelatujące przez Jaworzynę Spizką.

Co się tyczy wymienionego przez hr. WODZICKIEGO: *Pyrrhocorax pyrrhocorax* Cuv. Wronczyka żółtodzióbego, oświadczyć z całą pewnością muszę, że ptaka tego w Tatrach nie ma. Ani p. SCHAUER, ani prof. Dr. NOWICKI, ani p. KOCYAN, ani zresztą żaden z zamieszkujących Tatry, ptaka tego nie widział. Znany z sumiennych prac swych hr. WODZICKI i w tym przypadku na ślepo nie działał, trudno mi jednak pojąć, dla czego by go obecnie nie było. Z badających Tatry przyrodników, jeden tylko Dr. ANTONI ROGALSKI ptaka tego miał widzieć na szczycie Hawrania (6815' n. p. m.), osobiście jednak tej wiadomości stwierdzić nie mogłem, bo wzbronił mi tego Dyrektor dóbr księcia Hohenlohego w Jaworzynie Spizkiej p. KEGEL. Dozorcy lasów Jaworzyńskich, w których terytoryjum grupa Hawrań - Murań leży, znają dobrze gawrony i kruki, ptaka tego nigdy nie zauważyli. Pan KOCYAN posiada okazy tego ptaka również jak i *Pyrrhocorax alpinus*, ale pochodzą one z Salzburga; sam jednak nigdy go nie spostrzegł. Hr. WODZICKI widywał ptaka tego nad Morskim Okiem i na północnej stronie Rohacza, nigdy niżej jak 5000' n. p. m., a p. SCHAUER z żalem wypowiada zdanie, że mimo najusilniejszych poszukiwań odkryć go nie mógł. Mojem zdaniem należy go z ptasni tatrzańskiej wykluczyć.

¹⁾ Czy ze stadami wron, kawek i gawronów pojawia się pod Tatrami i Czarnowron (*Corvus corone*) powiedzieć nie mogę. Tam go nie widziałem, a pewnych wiadomości zasięgnąć nie mogłem. P. KOCYAN posiada 2 okazy z Salzburga.

30. *Pica caudata* Briss. Sroka zwyczajna (Wodz.). Pospolita przy brzegach lasów, najwyżej gnieźdząca się widziałem przy Hali Królowej; przy osadach Podhala nierzadka. Przy Szaflarach kilkanaście gniazd widziałem.

31. *Gurrulus glandarius* Cuv. Sojka pospolita (Wodz. Sch.). W reglach nierzadka. Zarówno w liściastych jak szpilkowych lasach. Najwięcej widziałem okazów na bokach Krywania, co już i p. SCHAUER zauważył, oraz przy Jaworzynie Spizkiej na zboczach Holicy.

32. *Nucifraga caryocatactes* Temm. Orzechówka stryszek Tyz. (Wodz. Schau.). Zamieszkuje regle i krainę limby, karmiąc się jej nasionami; nierzadka w lasach bukowych.—Widywałem ją w Olczysku, przy Morskiem Oku, w dolinie Ciemnych Smereczyn. Gniazdo widziałem w reglach Krywania. Górale zwią ptaka tego „Sojką halną.“

33. *Bombycilla garrula* Temm. Jemiołucha jedwabniczka Rz. (Wodz.). Zlatuje w jesieni do Tatr; z nastaniem śniegów posuwa się ku równinom. Według opowiadania górali, ma się w twardych zimach liczniej zjawiać—co już i hr. WODZICKI zauważył.

34. *Coracias garrula* Linn. Kraska gwarliwa Tyz. Niezauważona przez poprzednich badaczy. Zamieszkuje brzegi Dunajca, nie zapuszczając się w góry; bawi przez lato. Ostatni raz ją spotkałem w połowie drugiej Sierpnia na Dunajcu między Poroninem a Zakopanem. Według p. PAWLICY długo w Tatrach nie bawi, ale się gnieździ. U p. KOCYANA znajduje się okaz jeden.

35. *Oriolus galbula* Linn. Wilga żółta (Wodz.). Krótco bawi w niższych lasach tatrzańskich; w połowie Lipca widywałem ją przy Kuźnicach Zakopiańskich, Nosalu i Poroninie. Według hr. WODZICKIEGO pojawia się już z początkiem Czerwca.

Insectivores. — Owadożérne.

36. *Turdus torquatus* Linn. Drozd okowiak Now. (Wodz. Now. Sch.). Drozd ten zamieszkuje lasy i kosodrzewinę bądź pojedynczo, bądź w małych stadkach i bawi od Kwietnia do Października. W większej ilości ptaka tego, łatwego do rozpoznania od pokrewnych po barwie i obręczy, spotykałem przy Pańszczycy, w dolinie Kościeliskiej i Hrubym Reglu. Znane są przykłady zimowania ptaka tego w Tatrach. Zdarzają się również odmiany, jak to naocznie stwierdzić mogłem, że biała obręcz rozszerza się bardzo, że prawie cały spód ciała jest biały.

37. *Turdus viscivorus* Lin. Drozd paszkoł Gmin. (Wodz. Sch.). Stały mieszkaniak lasów, wychodzi nawet i w kosodrzewinę; trzyma się jednak chętniej słonecznych zarośli. Gniazda jego spotykałem w Lipcu przy polanie Waksmundzkiej, przy Węwrzeczkuwój Cyrli, Toporowym Stawku. Młode w znacznej ilości w Kościeliskiej do-

linie. Zimową porą łączy się w stadka z kwiczołami i z temi wędrowniki odbywa. W dolinie Kościeliskiej spotkałem parkę barwy prawie białej, co zdaniem strzelców tatrzańskich często się zdarza.

38. *Turdus musicus* Linn. Drozd śpiewak Tyz (Wodz. Sch.). Ptak ten przez górali „Mazakiem“ zwany, jakkolwiek nie odróżniają go od gatunku następnego, wraz z poprzednim zamieszkuje lasy, od osad ludzkich począwszy aż po górną lasów granicę. Śniegi i mrozy spędzają go w Listopadzie na niziny, zkąd z początkiem Marca wraca. W łagodnych zimach pozostaje przy brzegach lasów.

39. *Turdus iliacus* Linn. Drozd rdzawoboczny (Wodz. Now.). Ptak ten wielu odmianom ulegający, z charakterystycznym zabarwieniem spodni i słabizn pospolity na węgierskiej stronie Tatr. W równiny zalatuje jesienią. Spotykałem go tylko w słonecznych miejscach przy Łyséj polanie i Jaworzynie Spizkiej; w tém ostatniém miejscu jeszcze 2 Sierpnia 1881 gniazdo z jajami, co chyba miało miejsce wyjątkowo, bo o ile zasięgnąć mogłem wiadomości, gnieździ się z początkiem Maja.

40. *Turdus pilaris* Linn. Drozd kwiczoł Rz. (Wodz.). Przebywa od Października do Lutego w niższych lasach i krzakach; ostra zima spędza go w równiny. Pojedyncze okazy blakają się już w Sierpniu po słonecznych dolinkach, jak u. p. przy Jaworzynie Russinowej, zkąd miałem dwa okazy.

41. *Turdus saxatilis* Linn. Drozd skalny Tyz (Zaw. Wodz.). W galicyjskich Tatrach dość rzadki, jedną parę widziałem gnieźdzącą się w Holicy; kilka sztuk drozdów, między niemi i 3 tego gatunku, pokazywano mi w karczmie w Jaworzynie Spizkiej. W zbiorze p. KOCYANA znajduje się samczyk w stroju letnim, pochodzący z Orawy.

Na tém miejscu zgodnie z hr. WODZICKIM zauważyć muszę, że wymienionego przez ś. p. ZAWADZKIEGO w spisie ptaków galicyjskich, jako mieszkańca Tatr i Karpat gatunku drozda: *Turdus astroregularis* nigdzie w Tatrach nie widziałem, ani nie zauważył go p. KOCYAN.

42. *Turdus merula* Linn. Drozd kos (Wodz. Sch.). Bawi tylko przelotnie w Tatrach i to w niższych lasach i krzakach. O gnieźdzeniu się nie mogłem pewnych zasięgnąć wiadomości.—W Sierpniu spotkałem go w dolinie Kościeliskiej. Pospolity w lasach przy Nowym Targu i Rabce.

Szpaka skorzca nie wymieniam w niniejszym spisie, jak to również hr. WODZICKI i p. SCHAUER uczynili; z parki, jaką przy Szafarach w pierwszej połowie Lipca widziałem, nie mogę wnosić, czy przebywa i w górach—tam go nigdzie nie spotkałem. Przy Podspadach na Spiżu rokrocznie kilka par ma się pojawiać. W Nowym Targu widziałem kilka okazów więzionych w klatkach; objaśniono mnie, że z węgierskich Tatr pochodzą (?).

43. *Cinclus aquaticus* Bechs. Pluszcz korduszek (Wodz. Sch. Now.). Trzyma się strumieni górskich, posuwając się aż po górną granicę kosodrzewia. Najwyżej widziałem go przy Siklawie i wodospadzie nad Morskim Okiem. Gniazdo spotkałem w potoku przy Psiej

Trawce, w Kuźnicach i Kościeliskiej dolinie. W tegie zimy według p. PAWLICY schodzi w młaki bliżej wsi. W okolicach Rabki nierzadki.

44. *Lanius excubitor* Linn. Dzierzba srokosz Rz. (Wodz.). Trzyma się bliżej osad ludzkich; na polach Poronina i Olczy nierzadki. Kilka okazów spotkałem w Jaworzynce za Kuźnicami. Gniazdo opodal Jaszczurówki.

45. *Lanius minor* Gmel. Dzierzba czarnoczelna Jar. Gatunek ten łatwy do odróżnienia na pierwszy rzut oka od pokrewnych szeroką plamą czarną przez oczy, o skrzydłach i ogonie czarnym, z białem lusterkiem i gardłem, znacznie rzadszy od poprzedniego. — Nie brak go jednak na polach i krzakach Poronina, Murzasichla, Białego Dunajca. Ptaka tego równie jak i następnego nie znajduję w wykazach ptaków tatrzańskich. W zbiorze P. KOCYANA znajdują się 4 okazy.

46. *Lanius collurio* Briss. Dzierzba cierniokręt Jar. Na słonecznych polach i krzakach przy Jaworzynie Spizkiej, Poroninie i Kościeliskach dość pospolity, w lasy dolin tatrzańskich nie zapuszcza się, z wyjątkiem może doliny Kościeliskiej, gdzie go na gorącym zdybałem uczynku. — W zbiorze p. KOCYANA znajduje się jeszcze parka (*Lanius rufus*) Dzierzb rdzawogłowej, pochodzenia Orawskiego. Ptak ten w kraju naszym bardzo rzadki (Dziedusz. Zaw. Wodz.), chyba wyjątkowo zaleciał w tamte strony; nigdy go nie spotkałem w Tatrach, a raz tylko w okolicy Krakowa.

47. *Muscicapa grisola* Lin. Muchołówka szara Jar. (Wod.). Miły ten ptaszek trzyma się osiedli ludzkich; widziałem go gnieźdzącego się w ogrodzie przy dworze w Kuźnicach, w Poroninie, przy początku doliny Strążysk i Miąsusięj. W drugiej połowie Sierpnia już go nie widziałem.

48. *Muscicapa atricapilla* Linn. Muchołówka żałobna Tyz. (Wodz.). Gatunek ten według WFDZICKIEGO nieznoszący zimnych Tatr, w samą rzecz turni nie zamieszkuje; nie brak go jednak u podnóża Tatr, gdzie z początkiem Lipca spotkałem jeszcze samiczkę gnieźdzącą się w krzakach przy tartaku w Kuźnicach. Kilka okazów ozna czyłem sobie a później łatwo rozróżniłem w Nosalu przy Jaszczurówce, Krokwi. W dolinie Kościeliskiej wyżej jak przy Altanie Goszczyńskiego jęj nie widziałem. Równie jak poprzednia znikła mi już z oczu w połowie Sierpnia.

49. *Muscicapa parva* Bech. Muchołówka rdzawka Tyz. Tęj muchołówki hr. WODZICKI na galicyjskiej stronie Tatr nie spotkał; byłem tak szczęśliwym, że w kilkunastu okazach obecność ptaszka tego u podnóża Tatr stwierdził. Bawi ona od Maja do końca Września w niższych zaroślach, słonecznych krzakach, n. p. nad potokiem w Zakopanem, w ogrodzie przy szkole snycerskiej w Kuźnicach. — W ogólności nie musi być tak rzadka, skoro ją i strzelcy tatrzańscy pod nazwą „Muchołapka“ znają, i oni mnie na ptaszka tego naprowadzili. Z równin mało znam ptaka tego; w okolicy Ojcowa i Mni-

kowa widziałem go w parce krążącego i głosem miłym a donośnym się wabiącego. W zbiorze p. KOCYANA wszystkie te muchołówki kilkoma egzemplarzami są reprezentowane Ptasek ten z przodu do raszki podobny, ale o wiele mniejszy; buduje sobie misterne małe gniazdko, zupełnie do gniazdka gajówek podobne, z cienkich gałązek — nie używa jednak, o ile na jednym okazie zauważyłem, włosienia do podściółki.

50. *Saxicola oenanthe* Bech. Podkamionka wielka Pietr. (Wodz.). Pospolita przy kamienistych potokach lub dolinkach. Posuwa się aż w kosodrzewinę, n. p. na Lilijowem, na Bystrém, w dolinie Białego potoku, hali Kondratowej i Goryczkowej. Bawi od Kwietnia do pierwszych dni Września.

51. *Saxicola rubetra* Bech. Podkamionka łączna (Wodz.). Znacznie rzadsza od poprzedzającej, nie posuwa się tak wysoko jak tamta; nieliczne okazy widziałem w dolinie Bystrój, Jaworzynce, Psiej trawce 16 Lipca 1881. Odlatuje na galicyjskiej stronie przynajmniej znacznie wcześniej od poprzedzającej, skoro już w drugiej połowie Sierpnia nie spotykałem jej. P. KOCYAN posiada parkę tego ptaka w swym zbiorze.

52. *Saxicola rubicola* Bech. Podkamionka czarnoszyja. Pietr. (Wodz.). Przebywa od Maja do końca Września lub początku Października (według p. PAWŁICY) w niższych górach i ugorach. Jeden okaz schwytano w Kuźnicach i ten przez dwa dni chowałem; mogłem więc należycie stwierdzić gatunek, znany mi jeszcze z Ojcowskich skał, gdzie nielicznie się gnieździ. Spotykałem ją przy Kalatówkach, przy Poroninie, Bukwinie, Murzasichlu.

53. *Accentor modularis* Cuv. Płochacz pokrzywnica. Jundz. (Wodz. Sch.). Mniej pospolity od następnego gatunku, sięga aż po górną granicę lasu. Najwyżej spotykałem go w dolinie Kamienistej i przy hali Pysznej 4271'. Pojedyncze okazy i gniazdko w Olczysku, w dolinie Bystrój („na Bystrém“), w Zakopanem, przy drodze do Kościelisk.

54. *Accentor alpinus* Bech. Płochacz alpejski Jar. (Wodz. Sch. Now.). Zamieszkuje całe Tatry stale; latem okolice wyżej 4000', zimą schodzi niżej. Kolonie ptaka tego spotykałem na Czerwonym wierchu, Małolączniaku, na Kasprowej, na Czubie Goryczkowej (5922'), na Błyszczu (6915'). Gniazda przy Tomanowej polskiej.

55. *Motacilla alba vel cinerea* Lin. Pliszka biała Jundz. (Wodz. Sch.). Przebywa w pobliżu osiedli ludzkich od Kwietnia do Października, posuwając się do niższych dolin tatrzańskich, Kościelisk, Strążysk, Kuźnic.

56. *Motacilla flava* Lin. Pliszka żółta Kluk. (Wodz. Now.). W Podhalu rzadsza; towarzyszy jednak białej nad potokami o brzegach żwirowych, i wyżej od tamtej nie wychodzi. Kilka okazów spotykałem w Zakopanem przy drodze do Poronina i na Bystrém.

57. *Motacilla montium (boarula)* Brehm. Pliszka górska Wodz. (Wodz. Sch. Now.). Bawi w Podhalu od Kwietnia do końca Września,

Towarzyszka pluszcza i płochacza alpejskiego aż w górną granicę kosodrzewiny. Najwyżej spotkałem ją przy szałasach Gąsienicowych, przy hali Pysznój, Ornaku, Tamanowej, Ciemnych Smereczynach. ¹⁾

58. *Anthus arboreus* Bech. Świergotek drzewny Jar. (Wodz. Sch.). Nierzadki w wyrębach i słonecznych krzakach w lasach niższych. Bawi od Kwietnia do Października (Now.). Wysoko w góry nie idzie i tu go zastępuje:

59. *Anthus aquaticus* Bech. Świergotek siewarnik Lud. (Wodz. Sch.). Pospolity mieszkaniec Tatr aż po górną granicę kosodrzewiny i nawet wyżej, tu się gnieździ. Na trawiastych szczytach Czerwonych Wierchów, Lilijowego, na Goryczkowej, Bystrzej, Kamienistej, Jeżowej, Kliwie i t. p. pospolity. Niżej jak 3000' go nie spotkałem. Hr. WODZICKIEMU zawdzięczamy najobszerniejsze wiadomości co do życia, gniazda i pory lęgowej, tego tak mało znanego gór mieszkańca.

60. *Salicaria palustris* Bla. Trzciniak łożówka Tyz. Ptaska tego znam tylko z nielicznych okazów z bagien przy Poroninie i Cichem. Ztamtąd miałem jeden okaz odbity krogulcowi mocno uszkodzony; kilka okazów w różnej porze tam spotykałem w Lipcu i z początkiem Sierpnia liczniej niż z końcem. W wykazach ptaków tatrzańskich nie spotykałem go, a błota te nie są stare; również nie ma go w zbiorze p. KOCYANA. Gniazdka mimo poszukiwań dla grzęzkiego gruntu odnaleźć nie mogłem; nie wątpię, że się tam gnieździ, choć nie znają go mieszkańcy Podhala. Innych gatunków znaleźć nie mogłem. W okolicy Krakowa, osobiwie przy Zabierzowie i Rząsce nierzadki.

61. *Ficedula sibilatrix* Bla. Gajówka świstunka Tyz. (Wod.). Przebywa przez lato w niższych lasach liściastych i krzakach. Parki ptaka tego spotykałem kilka razy przy polanie Filipce, Kościeliskiej dolinie oraz przy kościele w Zakopanem. W zbiorze p. KOCYANA znajduje się jeden okaz pochodzenia tatrzańskiego.

62. *Ficedula rufa* Bech. Gajówka rudawa Tyz. (Wodz. Now.). Co do ptaka tego zupełnie zgodzić się muszę na uwagę hr. WODZICKIEGO: nasze Tatry muszą być dlań za zimne, bawi też w niższych lasach z początkiem lata, w początku Sierpnia widziałem go już tylko w ogrodach Poronina.

63. *Phylloperuete fitis* Wol. Gajówka pierwiosnka Tyz. (Wod. Sch.). Według hr. WODZICKIEGO w Karpatach pospolity; nieliczne okazy tylko spotykałem w lasach przy Kalatówkach, Goryczkowej, Olczyku. Bawi od Kwietnia do końca Sierpnia. W krzakach nad Dunajcem słyszałem, o ile mi się zdaje, głos Gajówki szczebiotliwej *Ficedula hypoleis* Bla. (Wodz.), nie mogłem jednak mimo pil-

¹⁾ Po bliższe szczegóły co do rozmieszczenia Pliszek odsłałem do 3go obrazka z tatrzańskiej fauny, skróconego przez mnie w „Przyrodniku“ Nr 24 Rocznik II.

nego poszukiwania stwierdzić obecności. Również nigdzie jęj zobaczyć w Podhalu nie mogłem — znam ją zresztą dobrze z równin, ponieważ także p. KOCYAN okaz jaki posiada nie ma z Tatr leca z Galicyi, przeto w spisie niniejszym ją pomijam.

64. *Sylvia atricapilla*. Lath. Pokrzywka czarnogłówna Lud. (Wodz.). Sama nazwa diagnozę podaje. Przebywa od końca Kwietnia do połowy Sierpnia w Tatrach, trzyma się zarośli i krzaków ocieniających strumyki, przy „wywierzysku Bystrój“ nierzadka; spotykałem ją przy Siklawicy w dolinie Strążysk, w hali Miętusiej, w Kuźnicach prawie codziennie po kilka okazów.

65. *Sylvia hortensis* Bech. Pokrzywka ogrodowa Pietr. (Wodz.). Rzadko ją widywałem w Tatrach; kilka okazów w ogródku na Jaworzynie Spizkiej, przy kościele w Poroninie.

66. *Sylvia cinerea* Lath. Pokrzywka popielata Dzied. (Wodz.). Posuwa się najwyżej z gajówek aż w kosodrzewinę, pospolita w dolinach tatrzańskich, przy Sarniej Skale, przy polanie Filipce, w lasach przy Toporowym stawie, w Olczysku. Bawi od Kwietnia do początku Września.

67. *Sylvia curruca* Lath. Pokrzywka piegza Rz. (Wodz.). Nie wychodzi wysoko w góry, spotkałem ją tylko w Poroninie i ogrodzie w Kuźnicach, gdzie się gnieździ, i gdzie jeden okaz schwyciłem. P. KOCYAN posiada okazy wymienionych tu pokrzywek z Tatr.

68. *Lusciola thythis* Bla. Słowik kopciuszek (Gazda szalaśny). (Wodz. Sch. Now.). Towarzyszy szalaśsom i sięga aż po górną granicę kosodrzewiny, gdzie się gnieździ; prawdopodobnie dwa razy, bo jeszcze w Sierpniu spotykałem gniazda z jajami i młodem w dolinie Kościeliskiej, przy Gąsienicowych szalaśsach w szopie, w dolinie Wierch-Cichój. Górale barwę jego przypisują pobytowi w dymnych szalaśsach. Głos jego mile rozwesela ponurą ciszę przy wysoko położonych kotlinach, n. p. Kraków w dolinie Kościeliskiej, gdzie oprócz niego 19 Lipca 1881 żadnego innego ptaka nie spotkałem.

69. *Lusciola phonicurus* Bla. Słowik pleszka Dzied. (Wodz.). Samica ptaszka tego bardzo do poprzedniego podobna; różna białością na gardzieli, z piersiami rdzawymi u samczyka, gdy poprzedni te części ma czarne. Widywałem go w krzakach nad Dunajcem przy Poroninie i Zakopanem, również w Małej Łące. Podhalanie nie rozróżniają go od „Gazdy szalaśnego“. Okazy miałem z Małej Łąki.

70. *Lusciola rubecula* Key et Bla. Słowik rudzik Dzied. (Wodz. Sch.). Pospolity w słonecznych miejscach aż w kosodrzewinę. Pozostaje aż do jesieni w tej wysokości. Ściele gniazdko dwa razy.

W spisie niniejszym pominąć muszę obydwaj krajowe gatunki Słowika, tak mile uprzyjemniające wiosenne noce; widocznie w Tatrach musi im być za zimno (niekiedy do końca Maja śnieg leży), skoro w wycieczkach moich nawet w niższych regijonach Tatr nigdy ich nie spotkałem. Jak mnie pewien obywatel w Nowym Targu zapewniał, w najbliższych okolicach tego miasta wywodzą się słowiki co roku, tak samo w Rabce i Krynicy. Wszystkie tu wymienione gatunki słow-

wika znajdują się w zbiorze ptaków tatrzańskich p. KOCYANA; pominęte gatunki reprezentowane tam są przez okazy z Galicji zachodniej i Salzburga.

71. *Regulus cristatus* Lin. Królik czubaty Rz. (Wodz. Sch.). Wspólnie z poprzedzającym gatunkiem przebywa w lasach iglastych w dolinkach tatrzańskich, spotykałem go jeszcze na Krywanu.

72. *Regulus ignicapillus* Brehm. Królik żniczek Tyz. (Now. Sch.). Żyje wspólnie z poprzednim a obecność jego utwierdził p. SCHAUER i ja sam na kilku okazach udzielonych mi przez dozorcę lasowego w Strążyskach.

73. *Troglodytes parvulus* Temm. Strzyżyk wołowe oczko Rz (Wodz. Sch.). Towarzysz pluszcza i pliszki górskiej, posuwa się aż w górną granicę kosodrzewiny; nie rzadki w dolinach tatrzańskich, spotykałem go przy Siklawie, Grzmocie, Roztoce.

Granivores. — Ziarnojady.

74. *Alauda arvensis* Lin. Skowronek rolny Tyz. (Wodz.). Nie zapuszcza się w góry, ograniczając się na pola owsem obsiane.

75. *Alauda arborea* Lin. Skowronek borowy Rz. (Wodz. Sch.). Trzyma się krzaków i lasów niższych, posuwa się jednak aż na polany więcej do słońca położone. Młode niedobrze opierzone spotykałem w Lipcu na Palenicy 3780', Rusinowej polanie 4106', na Cichém, przy Łysiej polanie 3069'.

76. *Alauda cristata* Lin. Skowronek dzierlatka Rz. (Wod.). Nie zapuszcza się w doliny tatrzańskie, pospolita koło domostw przy Zakopaném, Szaflarach, Bukowinie, Kościeliskach, Jaworzynie Spizkiej.

Skowronka górniczka (Kluk), *Alauda alpestris* Lin. nie ma zupełnie w Tatrach ani na przelotach, ani stale. Pomijam go tedy w wykazie ptaków tatrzańskich. Okaz znajdujący się w zbiorze p. KOCYANA pochodzi gdzieś z Galicji zachodniej, w każdym razie nie jest pochodzenia tatrzańskiego. W zimie 1879 na 1880 w okolicy Krakowa dość był liczny przez miesiąc Marzec.

77. *Parus major* Lin. Sikora większa Jundz. (Wodz.). Przebywa w lasach niższych n. p. na Nosalu, w dolinie Kościeliskiej, przy Jaszczurówce i t. p.

78. *Parus coeruleus* Sikora modra Rz. (Wodz.) nie posuwa się wysoko w góry; widywałem ją na Krupówkach, przy Kuźnicach Zakopiańskich, przy Poroninie, Olezy, polanie Białej wody, widywałem nawet okazy prawie szare o słabym, na pierwszy rzut oka nawet niewidocznym, odcieniu niebieskiego koloru.

79. *Parus ater* Lin. Sikora sosnówka Kluk. (Wodz. Sch.). Sikora ta wspólnie z gatunkiem następnym zamieszkuje regle aż do górnej granicy lasu, szczególniej lasy sosnowe; nie brak jej na mo-

drzewiach w dolinie Białego potoku, gdzie jednego dnia 14 gniazd naliczyłem.

80. *Parus cristatus* Lin. Sikora czubata Rz. (Wodz. Sch. Now.). Pospolita nad wodami tatrzańskimi; sięga aż po górną granicę lasu. Gnieźdzącą się spotykałem na Kasprowej, Goryczkowej hali, w dolinie Wierch-Cichłej.

81. *Parus palustris* Lin. Sikora czarnogłówka (Wodz.). Ptak ten obecnie przynajmniej nie trzyma się granicy przez hr. WODZICKIEGO nakreślonej; bo właśnie nigdy nie spotykałem go wyżej, jak sięgają ostatnie siedziby człowieka — najczęściej przy Jaszczurówce; tu kilka gniazd z młodemi w Lipcu spotkałem, nad Dunajcami, Poroncem, przy błotach Furtackich. ¹⁾

82. *Parus caudatus* Lin. Sikora ogoniasta Jundz. (Wodz. Now.). Ptaka tego naocznie nie widziałem. Hr. WODZICKI zapewne bez podstawy go nie zamieścił, a że przebywa w Tatrach w jesieni późnej i na wiosnę, zapewniali mnie strzelcy tatrzańscy, również p. FINGER i PAWLICA. Wszystkie tu wymienione gatunki sikor znalazły pomieszczenie w zbiorze ptaków tatrzańskich p. KOCYANA. Nadmienię jednak muszę, że w porównaniu do lasów w okolicach Krakowa i Ojcowa, wyjąwszy *Parus cristatus* i *ater*, wszystkie sikory dość nieliczne się znachodzą; zapewne zimny klimat, a nie brak pożywienia jest tego powodem. Co do *Parus ater* zapewniał mnie przewodnik i dobry znawca kręgowców tatrzańskich WALA, że przed kilku laty w krzaku jednym w Zakopanem, 4ry razy do roku miała młode, jak również, że w zimnych wilgotnych latach, wszystkie sikory w nader małej pokazuują się liczbie. Przy Kalatówkach udało mi się w Lipcu 1881 dostać stary okaz sikory wielkiej bez czarnego na brzuchu paska, zupełnie jednostajnej na tém miejscu barwy. Okaz ten z powodu zakazu używania fuzyi w dobrach Zakopiańskich, zastrzelony z rewolweru był nie do użycia; a żałuję mocno, bo w równinach nigdy podobnej odmiany nie spotkałem. Roku bieżącego, jak mi właśnie doniesiono, w okolicy Nowego Targu, sikora wielka w znacznie większej jak w poprzednie lata pojawiła się ilości; ma to być dla Podhalan zapowiedź lekkiej zimy i wczesnej ciepłej wiosny.

Na tém miejscu zaznaczyć muszę ciekawy fakt co do pojawów sikor w okolicach Krakowa. — Od kilku (6) lat spostrzegam, że gatun-

¹⁾ P. Kocyan doniósł mi, iż bawiący roku zeszłego u niego ornitolog niemiecki p. TSCHUDI ZU SCHNIDTHOFFEN okazy przezeń zebrane jako *Parus lugubris* oznaczył. Różnice zachodzące między *Parus palustris* a *Parus borealis*, która znowu niekiedy z *Parus lugubris* bywa mieszaną, są nader małe; a rozchodzi się tylko o większy lub mniejszy platek czarnej barwy na głowie i upiérzenie spodu ciała barwy białej lub szarej. Różnice te są tak małe, iż pomyłka łatwo wydarzyć się może. Okazy, jakie dostałem, po dokładnem oglądnięciu przedstawiły mi tenże gatunek. Czyżby prócz tego i drugi doni zbliżony znachodził się w Tatrach?

ki *Parus ater* i *palustris* powoli wypierać zaczynają słabą sikorę modrą. W ogrodzie botanicznym w Krakowie, gdzie od dość dawna dostrzeżenia moje nad pojawem ptaków robię, od tego czasu rokrocznie coraz mniej tegoż gatunku spotykam, również i w lasach okolicznych. Dostrzeżenie to potwierdzili i ptasznicy krakowscy, u których sikora modra i ogoniasta w najwyższej między pokrewnymi jest cenie. Miałżeby to być na małą skalę objaw walki o byt?

83. *Emberiza citrinella* Lin. Poświerka trznadel (Wodz. Sch.). Pospolity przy osadach w Podhalu, w góry się nie zapuszcza.

Emberiza miliaria Lin. Poświerka potrzuszcz, *Emberiza nivalis* Lin. Poświerka śnieguła i *Emberiza schoeniclus* Lin. Poświerka potrzos pojawiają się tylko w niektórych latach.— Pierwszą z nich spotkałem koło karczmy w Jaworzynie Spizkiej. Podhalanie nie robią różnicy między nią a trznadlem (!). Nie wiadomo mi nic o gnieźdzeniu się jej. Drugi gatunek też tylko wyjątkowo i to w ostrych pojawia się zimach. Trzeci gatunek, jak mnie z kompetentnej poinformowano strony, zlatuje w okolice Szmeksu i Kolbachu, lecz również się nie gnieździ.

Wszystkie trzy w kilku z Tatr pochodzących okazach reprezentowane są w zbiorze p. KOCYANA. Nie mogąc pewnych zasięgnąć wiadomości, pomijam je w spisie ptaków tatrzańskich — a wartoby kwestyję pobytu tych gatunków w Podhalu wyświecić; osiągnąć to będzie można tylko przez badanie w różnej porze roku pojedynczych regionów Tatr, sam fakt spotkania, nie poparty z innej strony, bodaj zdaniem jakiego mieszkańca Tatr, nie może w tej mierze jeszcze rozstrzygnąć.

84. *Loxia curvirostra* Lin. Krzyżodziób krzywodziób. Rz. (Wodz. Sch.). Zamieszkuje jodłowe i świerkowe lasy tatrzańskie, bądź stale, bądź peryjodycznie. Na Krywaniu w dolinie Niewcyрки, w Kościeliskiej dolinie i Krokwi spotykałem go stadkami. Zimą porą w większych stadkach przybywa. W Styczniu 1882 przysłano parkę z Zakopanego do wypchania przyjacielowi memu p. SEWERYNOWI PIOTROWSKIEMU; przedstawia ona dwa przeciwieństwa pod względem ubarwienia, od purpurowo-czerwonej barwy do zielonkowato-szarą. — Z ptaków tatrzańskich, o ile sam zauważyłem, po drozdach najbardziej do odmian skłonny. Oprócz ptaka tego wymienić, ale nie zamieścić w spisie ptaków tatrzańskich, mogę Krzywodzioba papużkę: *Loxia pythiopsitacus*, który wyjątkowo w ostrych zimach się pojawia, również dostrzeżonego przezemnie, bodaj czy nie po raz pierwszy, w galicyjskich Tatrach Krzywodzioba dwupręgowego Tacz. *Loxia bifasciata*. W młodym lasu modrzewiowym, zasianym na zboczu skał w dolinie Białego Potoka, spostrzegłem dnia 17 Lipca 1881 dwa okazy, zajęte oblamywaniem szyszek i gałązek. Pozwoliły się podejść bardzo blisko; ale ponieważ z powodu zakazu fuzyi nie wziąłem, mając jeden ładunek w rewolwerze grubszym śrutem nabity, wystrzeliłem do parki. Z powodu małej odległości działanie było za silne, bo jeden okaz tylko spadł bardzo zdeformowany strzałem, tak że o wypchaniu

badaj prowizorycznem mowy być nie mogło. O ptaku tym nie bliższego dowiedzieć się nie mogłem; pokazywałem skrzydła i opisywałem ptaka starym strzelcom jak KRZEPTOWSKIEMU, TATAROWI, PARZE, WALI i t. d. — zupełnie go nie znają, a w zbiorze p. KOCYANA zupełnie go nie ma, nie zauważył go nawet podczas swego długoletniego pobytu pod Tatrami. Zapewne wyjątkowo tylko zaleciały do nas z północno-wschodnich borów. Z pokrewieństwa tedy Krzyżodzióbów, jako Tatrom właściwy, wymienionym być tylko może Krzyżodziób krzywodziób; dwa inne gatunki, jako czasowo się pojawiające, zamieszczenia w ptasznictwie tatrzańskim mieć nie mogą.

85. *Pyrrhula vulgaris* Briss. Gil właściwy Tyz. (Wodz. Sch.). Po krzakach niższych i młodszych lasach pospolity, w dolinach tatrzańskich niższych, jak w Olczysku, Nosalu oraz Tomanowej, Ciemnych Smereczynach nierzadki. Gniazdko spotkałem w pierwszej miejscowości. Czasami wtowarzystwie gilów, w zimie częściej niż w lecie, zjawia się Gil dziwoni Tyz. *Pyrrhula erythrina* Temm. Zawsze jednak, podobnie jak w kraju, należy do rzadkości. O spotkaniu w Tatrach wymienionego przez hr. WODZICKIEGO Gila klęska Tyz. *Pyrrhula enucleator* Temm. nie mogłem żadnych zasięgnąć wiadomości — nie widywano go tamże, przeto omijam go w niniejszym wykazie. Okaz ptaka tego, jaki p. KOCYAN posiada, jest pochodzenia szwajcarskiego.

86. *Coccothraustes vulgaris* Pall. Grubodziób kostohryz. Dzied. (Wodz.). Zjawia się z końcem lata w lasach bukowych (Kocyan) sam w końcu Sierpnia w jednym z przysiółków Poronina podszedłem małe stadko tak blisko, iż należycie gatunek stwierdzić mogłem.

87. *Passer domesticus* Briss. Wróbel domowy Dz. i

88. *Passer montanus* Briss. Wróbel mazurek Gm. (Wodz.), oba gatunki trzymają się stale domostw i pól uprawnych, w góry się nie zapuszczając, przy Kuźnicach Zakopiańskich nieliczny.

89. *Fringilla carduelis* Lin. Łuszczałak szczygieł Tyz. (Wodz.). Przebywa na polach Podhala, w góry wysoko się nie zapuszcza. Widywałem go na ostach w dolince Białego, na zboczach Gwontu ku Kondratowej hali.

90. *Fringilla spinus* Lin. Łuszczałak czyż Rz. (Wodz.). Pospolity w reglach, szuka drzew młodszych i miejsc słonecznych do gnieźdzenia. Spotykałem go jeszcze za Roztoką, na zboczach Wołoszyna, przy Waksmundzkiej polanie. Gniazda dość licznie w pierwszej połowie Sierpnia w Olczysku.

91. *Fringilla serinus* Lin. Łuszczałak kulezyk (Sch. Now.). W lasach niższych liściastych, po ogrodach górskich w lecie nierzadki; na zimę jednak, jak mnie zapewniano, nie zostaje. W górskich lasach go nie spotykałem.

92. *Fringilla montifringilla* Lin. Łuszczałak jer. Tyz. (Wodz.). Zjawia się na wiosnę i jesień w lasach niższych, w okolicy Nowego Targu i Białego Dunajca widziałem kilka okazów, znacznie jednak rzadszy niż w równinach. W Nowym Targu widziałem kilka okazów

w klatkach; objaśniono mnie o ich tatrzańskiem pochodzeniu. W lasku na Gubałówce parę okazów zabito dnia 24 Sierpnia.

93. *Fringilla linaria* Lin. Łuszczałak czeczotka Tyz. (Wodz.). Przybywa na jesień do Podhala, jednakowoż nierzadkie są przykłady gnieźdzenia się na wiosnę i pozostania przez rok cały. Przy Murzasichlu i Olczy spotkałem takie okazy w Lipcu. Łuszczałaków: górniczka Tyz. (*Fringilla flavirostris* Lin.) skalnego (*Fr. petronia*), oraz *Fringilla citrinella* nie ma zupełnie w Tatrach; ptaki te żyjące nawet na niższych górach w Alpach i Pireneach omijają Tatry. Okazy znajdujące się w zbiorze p. KOCYANA są zagranicznego pochodzenia.

94. *Fringilla chloris* Temm. Łuszczałak dzwonic Rz. (Wodz.). Bawi przy brzegu lasów, nie posuwając się jednak w góry—gniazdka jego widywałem na Gubałówce, Wawrzeczkowej Cyrli i Murzasichlu.

95. *Fringilla cannabina* Temm. Łuszczałak makolągwa Rz. (Wodz.). Na polach Poronina i Olczy w Sierpniu małemi stadkami. ¹⁾

96. *Fringilla coelebs* Lin. Łuszczałak zięba Rz. (Wodz. Sch.). W dolinkach tatrzańskich niższych aż po górną granicę lasów pospolicie. W Małej Łące, dolinie Kościeliskiej, przy Tomanowej polskiej, przy Kuźnicach Zakopiańskich, w Ciemnych Smereczynach, na Krywanu, wszędzie w sporych stadkach. Wspomnieć muszę jeszcze o pojawianiu się czasowem: *Fringilla nivalis* na Orawie, gdzie w Orawicach zabito w przelocie okaz znajdujący się w zbiorze p. KOCYANA. Wyjątkowe jednak pojawienie się ptaka tego, jak również Poświerki śnieguły nie zalecają go do wciągnięcia w poczet ptaków Tatry zamieszkujących.

Zygodactili. — Dwuparzystopalcowe.

97. *Cuculus canorus* Lin. Kukułka właściwa (Wodz. Sch.). Po lasach aż do górnej tychże granicy nierzadka; młode kukułki widziałem w gniazdach Piegży i Podkamionki. P. SCHAUER na Bobrowcu w gnieździe *Sylvia spinoleuta* spotkał młode kukułcze. Na Wołoszynie nierzadka.

98. *Picus martius*. Dzieciół czarny Jundz. (Wodz. Sch.). Dzieciół ten pospolitszy w lasach liściastych niż szpilkowych posuwa się aż do 3500'.

99. *Picus viridis*. Dzieciół zielony Dzied. (Wodz.) przez górali „Żółną“ zwany. Stały mieszkaniem Podhala; lubi lasy mniej-

¹⁾ Uprzejmości kilku leśnych państwa Szaflarskiego i Zakopiańskiego zawdzięczam okazy, jakie z wyżej wymienionych Łuszczałaków oglądać miałem sposobność. Na nich też i tak już znane mi gatunki stwierdziłem z całą możliwą ścisłością.

sze, okolice więcj słoneczne, nie przywiązując się do gatunków drzew. Sięga do 2000' n. p. m.

100. *Picus canus*. Dzięcioł zielonosiwy Jar. (Wodz.). Rzadszy od poprzedniego; zamieszkuje lasy tatrzańskie w granicach różnych z czarnym.

101. *Picus major*. Dzięcioł pstry większy Tyz. (Wodz.). Zamieszkuje lasy tatrzańskie prawie do górnej ich granicy; pospolitszy po starych lasach, nierzadki na Krywaniu i przy osadach w Podhalu.

102. *Picus leuconotus*. Dzięcioł białogrzbiety Tacz. — Hr. WODZICKI w Tatrach go nie spostrzegł, również i p. Schauer. Szczegółowjć może niż inne ptaki obserwując dzięcioły w Tatrach, zbierając sobie materyjał do większej o nich publikacyi, dzięcioła tego między mieszkańcami Tatr pominąć nie mogę. Zamieszkuje on stare lasy n. p. przy polanie Filipce, Cichem, Nosalu, Olczysku, Furtakówkach. Będąc dobrze obznajomiony z odmianami, jakim dzięcioły pstre podpadają, snadno mogłem go od pokrewnych odróżnić, i o ile sam zauważyłem, jest najrzadszy z całej rodziny w tych stronach ¹⁾.

103. *Picus medius*. Dzięcioł pstry średni Tyz. (Wodz.). Towarzyszy w lasach szpilkowych dzięciolowi większemu, w liściastych nie tak wysoko się zapuszcza.

104. *Picus minor*. Dzięcioł pstry mały Tyz. Nieuważany przez poprzedników moich, bawi w Podhalu przez jesień i zimę, niekiedy i w lecie zostając. Spotykałem go przy osadach ludzkich, na wierzbach i olchach; w Jaworzynie Szpiżkiej nawet wśród domów.

105. *Picus tridactylus*. Dzięcioł trójpalczasty Jar. (Wodz. Sch.). Posuwa się wysoko w lasy, pospolitszy w górach niż w dolinie, gdzie zimową porą zlatuje. Spotykałem go na Wołoszynie, Krywaniu, Roztoce i lasach przy Toporowym stawie. Według wiadomości, jakich mi p. KOCYAN udzielił, dzięcioł ten obecnie staje się rzadszym z powodu znikania pni starych, podczas gdy na węgierskiej przynajmniej stronie Tatr dzięcioł pstry wielki bierze przewagę wśród pobratymców. Wszystkie tedy dzięcioły do krajowej ptasznii należące zaliczyć wypada do ptasznii tatrzańskiej; wszystkie są ochraniaane przez leśniczych dobrze znających ich pożytek, wbrew nowym a przez Dra ALTUMA rozpowszechnionym pogłoskom o wrzekomjć ich szkodliwości. W zbiorze p. KOCYANA wszystkie licznymi reprezentowane są okazami, równie jak i Krętogłów szary (*Junx torquilla*) przez hr. WODZICKIEGO do ptasznii tatrzańskiej wliczony, a którego nigdy w Podhalu nie spotkałem, ani innjć nie mogłem zasięgnąć wiadomości, prócz udzielonej mi przez p. FINGERA, że bardzo rzadko się pojawia na węgierskiej stronie. Zdaniem mójć ptak ten lubiący stare liściaste drzewa, nawet nie

¹⁾ Bliższe szczegóły co do pojawów tego ptaka w Tatrach podałem w rozprawce mójć pod tytułem: Obrazki z fauny tatrzańskiej IV, „Przyrodnik“ rok 1882. Gniazdo widziałem w Poroninie. Ptak ten jest pospolitszym na drzewach liściastych.

bardzo pospolity w zachodniej Gali cyi, w ptaszn i tatrzańsk i j pomieszczenia mieć nie może.

Anisodactylae. — Przyrośłopalcowe.

106. *Sitta europea* Lath. Bargiel kowalik Jundz. (Wodz.). Stale przebywa w niższych lasach, w dolinkach tatrzańskich i dolinie Kościeliskiej nierzadki, pospolitszy jednak na drzewach liściastych.

107. *Certhia familiaris* Lin. Pełzacz zaskórnik Now. (Wodz.). W reglach do wysokości 3000', w Nosalu nierzadki, to samo w Krokw i i Łysankach, wyższych gór unika. Sikory, dzięcioły, bargle i pełzacze dla wielkiej sw i j pożyteczności winny być ochrania ne. Dro bne bowiem szkodniki, a mianowicie chrząszcze, znacznie lasom tatrzańskim dały się we znaki; przy Roztoce, Wołoszynie, Kościeliskach wznoszą się całe obszary uschłych lasów, przez korniki i inne szkodniki zniszczone. Gdzie dzięcioł rady dać im nie może, wnet delikatne sikory i pełzacze dziesiątkują zastępy niszczycieli. W równinach szczególnie miałem sposobność przypatrzeć się użyteczności tych ptaków. W Tatrach w ogólności w mniejszej ilości występują, dla klimatu, a dzieciolom i barglom barwa nader się zmienia.

108. *Alcedo ispida* Lin. Zimorodek europejski. Nieuważany przez mych poprzedników, trzyma się rybnych potoków, jak Dunajca między Poroninem i Zakopanem i Białki. Widziałem go coś 3 razy, nad obu temi potokami. Według p. PAWLICY ma być rzadki; liczniej przy Poroninie w zimie się pokazuje. U p. KOCYANA znajduje się parka ptaka tego. Do czasowo tylko pokazujących się ptaków zaliczyć mi wypada: *Upupa epops*. Dudka właściwego, który na galicyjskiej stronie Tatr rzadko się pokazuje; raz go widziałem przy Bukowinie, drugi raz zabitego w Jaworzynie Spizkiej. W Podhalu się nie gnieździ.

109. *Tichodroma phoeniceptera* Temm. Pomurnik mentel Now. (Wodz. Sch. Dzied.). Ptak ten żyje w nagich turniach, w ogólności jest jednak rzadki. Spotykałem go na Lilijowie, Kościeliskiej dolinie, Kościelcu, Świnnicy, Wołoszynie. Do gniazda nigdy się dostać nie mogłem, chociaż go na Wołoszynie widziałem. W zbiorze p. KOCYANA znajduje się jedno jaje; rzecz nader rzadka w zbiorach zoologicznych.

Chelidones. — Paszczyste.

110. *Hirundo rustica* Lin. Jaskółka dymówka Jundz. (Wodz.). Pospolita przy osadach w Podhalu; w góry się nie zapuszcza, najwyżej widziałem ją przy zwałiskach w Kościeliskiej dolinie. Odlatuje wcześniej niż z nizin.

111. *Hirundo urbica* Lin. Jaskółka oknówka Gm. (Wodz.). Dzieli miejsce pobytu z poprzednim gatunkiem. W Jaworzynie Spizkiej i Kuźnicach Zakopiańskich nierzadka. Czy trzeci gatunek jaskółek: *Hirundo riparia* Jaskółka brzegówka bawi w Podhalu stwierdzić nie mogłem. W urwiskach brzeźnych przy Poroninie widziałem wprawdzie jamki, równie jak przy Białym Dunajcu; nie mogłem jednak dostrzedz ich mieszkańców, przeto omijam ją aż do dostatecznego wykazania. P. KOCYAN posiada parkę z tego gatunku pochodzącą z Orawy.

112. *Cypselus murarius*. Jerzyk murowy Jar. (Wodz. Sch. Now.). Pospolity mieszkaniec turni tatrzańskich, gnieździ się w skałach ponad kosodrzewiną, pospolitszy na wapieniach niż granitach. Bardzo liczny na Magórze, Kasprowej; widywałem go na Krywanu, Błyszczu, Starój Robocie, Wołoszynie. Drugiego europejskiego gatunku jerzyka *Cypselus melba* zupełnie w Tatrach nie ma, jak to już moi poprzednicy zauważyli.

113. *Caprimulgus europeus* Lin. Kozodój lelek (Wodz.). Od Kwietnia do końca Sierpnia przebywa w niższych lasach i nizinach, nierzadki przy Murzasichlu i Cichém.

Columbae. — Gołębie.

114. *Columba palumbus*. Gołąb grzywacz (Wodz.). Dość rzadki w Podhalu; spotykałem go rzadko parkami przy Murzasichlu i Bystrém, gniazda nigdy; ma przebywać tylko przez lato.

115. *Columba oenas* Lin. Gołąb siniak Jund. (Wodz.). Przebywa od Maja do Października bardzo licznie w górskich lasach, sięga aż po górną granicę regli; gniazda widziałem w Lipcu przy polanie Filipce. Parkę młodych ztamtąd posiada leśniczy w Poroninie p. PAWLICA, karmione ziarnem chowają się dobrze.

116. *Columba turtur* Lin. Gołąb turkawka Kluk. Rzadki w galicyjskich Tatrach; dzikie okazy widziałem w lasach Bukowiny i Jaworzyny Spizkiej, tamże w Sierpniu na złamanym smereku widziałem i gniazdko. W okolicy Szczawnic i na węgierskiej stronie Tatr nierzadki.

Gallinae. — Kury.

117. *Tetrao urogallus* Lin. Głuszcze właściwy Rz. (Wodz. Sch.). Żyje w reglach; kilka okazów, najczęściej samice, widziałem w Olczysku, Hrubym Reglu, Wawrzeczkowej Cyrli, przy Międzydrogach, Gęsięj szyi. Pospolita to wraz z pobratymcami zwierzyna lasów tatrzańskich, chociaż w miarę ubywania lasów coraz mniej go bywa, a nieumiejętném wybijaniem samce i młodych przez kłusowników nie

mała szkoda wyrządzoną bywa. Samice zwane kurami lub głuszcami, samce przez górali „głuchoniami“ zwane.

118. *Tetrao tetrix* Linn. Głuszec cietrzew Rz. (Wodz. Sch.). W reglach, w kosodrzewinie a nawet po lasach niższych się znachodzi. W Hrubym Reglu, w Toporowej i Wawrzeczkowej Cyrli nierzadki, przy stawie Toporowym a osobliwie przy wyrębach i maliniaku powyżej tej miejscowości bardzo często spotykałem okazy. Na Psięj Trawce dnia 25 Lipca 1881 o świcie spotkałem stadko z 15 sztuk na samej polanie. Ciekawą jest okoliczność, że stare „koguty“ dostają białe plamy na podgardlu i brzuchu, a okaz taki spotkałem raz tylko w Hrubym reglu.

119. *Tetrao bonasia* Lin. Kniejotok jarząbek Piotr. (Wodz. Sch.). Ze wszystkich kuraków najpospolitszy w reglach tatrzańskich; całe stadka spotykałem w Kościeliskiej dolinie, Małej Łące, Dolinie Białego, Piórze przy Jaszczurówce, w kosodrzewinie pod Żółtą Turnią.

P. SCHAUER, bawiąc w roku 1861 w Tatrach, zasięgnąwszy gdzieś wiadomości, jest powodem, że zdanie, jakoby Pardwa górska *Tetrao lagopus* żyła w Tatrach, utrzymuje się dotychczas. Strzelcy tatrzańscy i mnie podobne brednie opowiadali; mieli widywać „białe koguty“ to na Osobitéj, to w dolinie Kościeliskiej, kiedy im pokrótce opisał strój letni pardwy, prowadzono mnie do tych niby „kur“, tymczasem chwytały się tylko szczegółów; stara cieciorka podobną jest do pardwy, ale tylko z daleka i z za krzaków; z bliska od razu można oba gatunki rozróżnić, i te „inaksze kury“ były cieciorkami. Raz nawet pokazano mi jarząbka za taką pardwę. Z drugiej strony, jak już powyżej wspomniałem, ulega cietrzew niekiedy odmianom; nawet czasem przybiera białą barwę¹⁾; może być, że owe „białe koguty“ o jakich KRZĘPTOWSKI p. SCHAUEROWI opowiadał i co on *bona fide* przyjął, do takiej odnosiły się przypadkowej odmiany. Bądź co bądź, pardw obecnie w Tatrach nie ma, i jak mnie p. KOCYAN zapewniał, od 30 lat nie widziano okazu, a okaz jaki posiada, zagranicznego jest pochodzenia. Tak samo ma się rzecz z cytowaną w wykazie hr. WODZICKIEGO kuropatwą górską: *Perdix saxatilis*, tej stanowczo w górach nie ma. Okazy, jakie przeglądałem zabite w Olczysku, Kościeliskiej dolinie i Małej Łące były zwykłemi kuropatwami, a tak wybitnie od niej różniącej się kuropatwy górskiej nikt w Tatrach nie widział. — W Tyrolu i Bawaryi żyje ona na mniejszych nawet wysokościach niż Tatry. W Tatrach wczesna i ostra zima prędko wyginięcia jej byłaby przyczyną. Omijam ją tedy wraz z pardwą w niniejszym wykazie.

120. *Perdix cinerea* Lath. Kuropatwa właściwa Jar. (Wodz.). Żyje w polach Podhala, zapuszcza się nawet w doliny tatrzańskie; tu jednakowoż długo nie bawi, żeruje tylko i wraca, dla braku dostatecznej żywności. Okazy jakie oglądałem były niezmiernie chude. —

¹⁾ Vide: Przyrodnik. Rocznik III, Nr. I.: Cietrzew przez A. ULANOWSKIEGO.

W miejsce kuropatwy, która się niby różnić ma od tój, co w równinie żyje, pokazywano mi w dolinie Kościeliskiej starego, zbiedzonego jarząbka; różnica aż nadto wyraźna! Coś podobnego pokazywano Prof. Dr. NOWICKIEMU na Czarnej Górze pod nazwą „Kamionki.“

121. *Perdix coturnix* Lath. Kuropatwa przepiórka Rzą. (Wodz.). Żyje po polach uprawnych nie zapuszczając się w góry. Spotkałem ją i słyszałem przy Jaszczurówce, Poroninie, Gubałówce, Bystrém.

Grallae. — Podkasate.

122. *Charadrius minor* Mey. Siewka rzeczna (Wodz. Sch.). Widziałem nad Dunajcem w kilku okazach, również nad Białką w Lipcu i Sierpniu. Jaj ani gniazda nie widziałem, chociaż pewny jestem, że się gnieździ w tych stronach. Siewkę górną *Charadrius morinellus* Lin. spotkałem w 3 okazach w Tomanowej liptowskiej; sądzę jednak, że tylko przypadkowo się zatrzymała. P. KOCYAN posiada okaz zabity na Czerwonym Wierchu.

123. *Charadrius pluvialis* Lin. Siewka złocista Wodz. Widywałem na polach Poronina w kilku okazach; jeden okaz zabity przy Gubałówce oglądałem w Zakopaném. Ma ona być wcale pospolitą w niektórych latach; nie braknie jej jednak żadnego roku, jak mnie KRZĘPTOWSKI i leśny JARZĄBEK zapewniali. W zbiorze p. KOCYANA znajduje się jeszcze okaz zabity w przelotach: Siewki żółtodzióbój Jar. *Charadrius hiaticula* Lin. okazu jednak żadnego żywego nie spostrzegłem, ani żadnych zgół zasiegnąć nie mogłem wiadomości. Siewkę złocistą nie spostrzegam w żadnym spisie ptaków tatrzańskich ¹⁾.

124. *Vanellus cristatus*. Czajka właściwa Tyz. (Sch.). Kilka okazów ptaka tego widział p. SCHAUER przy Pięciu Stawach polskich. Tam go nie widziałem, ale na torfistych łąkach między Bystrém a Olczą w stadkach, raz przy Toporowym Stawku, Jaworzynie Spizkiej, oraz kilka okazów przy hali Królówej 10 Sierpnia. Należy do ptaków co rok się pojawiających, a o gnieźdzeniu się jej nie wątpię. W tém miejscu wspomnieć muszę według obcych i własnych spostrzeżeń nieco o ptakach, niedługo na przelotach się zatrzymujących. I tak Bocian biały. *Ciconia alba* nie gnieździ się w Podhalu, w przelotach zatrzymuje się ledwo kilka godzin dla wytchnienia. W drugiej połowie Sierpnia widziałem silne stado bocianów, przelatujące nad Czerwonemi Wierchami; kika sztuk odpoczywało 22 Sierpnia na przełęczy Toma-

¹⁾ Do porównania miałem okazy Siewki rzecznej i złocistej, kupione w Kościeliskach. Siewkę górną widziałem wcześniej rano w dzień ulewny przelatującą ku dolinie Wiercheichój. Okazu jednak dostać nie mogłem, a pewnych wiadomości nikt mi podać nie umiał; między kupionemi Siewkami były dwa młode okazy Siewki rzecznej.

nowej. Ś. p. JANOTA wspomina o odpoczywaniu ptaka tego na Szérokiej Jaworzyńskiej i Gubałówce. W zbiorze p. KOCYANA znajdują się okazy: Żórawia pospolitego, Czapli siwej i purpurowej, Bąka i Bączka, Warzęchy, 3 okazy Bataliona bojownika, zabite na przelotach na Orawie i Nowotargskiej dolinie.

125. *Numenius arquatus*. Kulon stępowy. Widziany w przełocie przez p. SCHAUERA; o ile sam stwierdziłem, żyje na łąkach przy Poroninie w końcu Sierpnia, przy Białym Dunajcu spotkałem go na polach i ugorach. Przy hali Smytniej wieczorem spotkałem stadko przelatujące, łatwe dla myśliwego do odróżnienia w locie.

126. *Tringa alpina* Lin. Biegus górny Tyz. Niewspominany przez mych poprzedników, żyje i gnieździ się przy wyższych stawkach; widziałem go bardzo blisko na stawkach w Tomanowej polskiej i przy stawkach pod Krywaniem. W tém drugiem miejscu były i młode okazy; ztąd wnoszę, że się gnieździć musi. Również przed wschodem słońca kilka sztuk na hali Ornak, znać wiatrem przygnane uwiijało się wesoło. P. KOCYAN posiada parkę tatrzańskiego pochodzenia.

127. *Totanus hypoleucos*. Kulik piskliwy (Sch.). Spostrzegany już przez p. SCHAUERA, podczas gdy Biegus górny nigdzie wymiennym nie był (!?); przebywa, ale nielicznie (o ile sam zauważyłem). Przy Ornaku, kilka okazów rano przy Smereczyńskim stawie, przy stawkach w Tomanowej, nadto przy błotach na Cichém, oto miejsca, gdzie go spotykałem. Bawi on przez lato w Tatrach; czy się gnieździ, nie wiem z pewnością. P. SCHAUER wspomina w swój rozprawie o jednym bardzo młodym okazie.

W zbiorze p. KOCYANA znajdują się zabite na przelotach okazy: Kulika samotnego (*Totanus ochropus*), K. leśnika (*Totanus glareola*) zabitego w Orawicach w Kwietniu, Kulika kwokacza (*Totanus glottis*) zabitego w lecie w Trstena na Orawie, Płatkono-ga płaskodzióbego (*Phalaropus platyrrhynchus*) zabitego przy Nowym Targu 1858 r. Okazy te dowodzą, że ptaki te gdzieś przez wschodnie Tatry przybywają w nasze strony.

128. *Scolopax rusticola* Lin. Bekas słąka Tyz. (Wodz. Sch.). Zamieszkuje od Kwietnia do Października lasy i krzaki w reglach, nierzadko spotkać ją można na ciągu przy kosodrzewinie. Widywałem go w dolinie Kościeliskiej, przy Cichém, na Wiktorówkach, w Pardołówce. Od czasu do czasu pojawiają się inne gatunki Bekasów, jak Dubelt, Kszyk, Ficlaus i na ciągu bywają strzelane; okazy tychże znajdują się w zbiorze p. KOCYANA.

129. *Crex pratensis* Mey. Chróściel derkacz Lud. (Wodz.). Spotykałem go i słyszałem na Cichém, Murzasichlu, Olczy, Jaszczerówce. Według p. PAWLICY, który roku ubiegłego kilka okazów zabił, nie zapuszcza się w góry lecz trzyma się łąk i pól podmokłych. Czy w Podhalu żyje i Wodnik właściwy: *Rallus aquaticus* Lin., z pewnością nie mogę powiedzieć; ani go widziałem tamże, ani pewnych zasięgnąć nie mogłem wiadomości. W zbiorze w Orawicach znachodzi się parka pochodzenia orawskiego.

130. *Gallinula chloropus* Lath. Kurka kokoszka Dzied. Spotykałem ją na Toporowym i Smereczyńskim stawie, gdzie w lecie zabijał p. FINGER kilka okazów. Mam wiadomość, że corocznie na Toporowym stawku się wywodzi, jak również i

131. *Gallinula pusilla* Mey. Kurka zielonka Dzied., której jeden okaz zabity tamże przez leśnego oglądałem przy Jaszczurówce. W Sierpniu widziałem i młode, a zatem gnieździć się tam musi. Oba gatunki nie są zamieszczone u mych poprzedników.

Dzikie gęsi przelatują tylko przez Nowotargską dolinę, zatrzymując się najwyżej dwa lub trzy dni, często z powodu mgły. O zabiciu gęsi posiewnicy *Anser segetum* na Murzasichlu wiem od p. PAWLICY. Jako czasowo się pojawiająca, zamieszczenia w niniejszym spisie mieć nie mogła.

Palmipedes. — Pletwonogie. ¹⁾

132. *Anas boschas* Lin. Kaczka krzyżówka (Wodz.). Żyje i gnieździ się lubo w szczupłej ilości na Toporowym i Smereczyńskim stawie, na wyższych stawach jej nie widziałem. Na wiosnę przylatuje blisko o 3 tygodnie później niż w równiny. O gnieźdzeniu się na Toporowym stawku mam wiadomości od p. PAWLICY.

133. *Anas querquedula* Lin. Kaczka cyranka Gmel. Przez hr. WODZICKIEGO tylko za czasową się pojawiającą miana, zdaniem p. PAWLICY, który corocznie kilka sztuk jej na Toporowym stawie ubija i leśnych z dóbr Szaflarskich, wywodzi się na tymże stawku na błotnistych brzegach.

Oprócz wymienionych tu ptaków zalatują w Tatry a szczególniej na Orawę i w okolicę Nowego Targu liczne gatunki Kaczek, Nurów,

¹⁾ P. E. SCHAUER, były kustosz zbiorów uniwersyteckich, ironicznie wyraża się w rozprawce swój p. t.: *Tagebuchsnotizen* i t. d. o podanej przez hr. WODZICKIEGO wiadomości o kaczce na stawach tatrzańskich. Zdaniem mým jednak niesłusznie. Strzelcy tatrzańscy niejednokrotnie widywali je na stawach niższych, gdzie i ja je widziałem i stąd okazy miałem. Prawda, że nie ma ich na Pięciu stawach polskich, ale bo ich tam hr. W. nie widział. Niesłuszna tedy uwaga p. SCHAUERA o ornitologicznych bajkach „*ornithologische Enten*“ jak i niesłuszne jego wyrażanie się o pracach tegoż sumiennego a tak dla kraju zasłużonego badacza, w innej rozprawce p. Sch. p. t.: *Die Murmelthiere und Zieselmäuse Polens u. Galiziens*. Uwagi te jednak, zdaniem mým, w niczém nie ujmują należytej doniosłości prac hr. W. W czasach, kiedy badacz ten cenne swe zapiski i spostrzeżenia robił, pracowników na polu przyrodznawstwa Galicyi ledwie kilku było, nauka znacznie niżej od dzisiejszego swego stanowiska stała, możliwe były więc omyłki, omyłki przypadkowe, jakie się przy najsumienniejszém badaniu wydarzać mogą. Podawanie zaś swych omyłek za pewność niezbitą i ogłaszanie ich umyślne w obcych językach rzuca złe światło na badacza, i powinno być obce sumiennym ludziom nauki.

Mew, Rybołówek, Perkożów i t. p.; pojawy to jednak niestałe, raczej przypadkowe, a zatem mimo że znajdują się w zbiorze p. KOCYANA i z tych pochodzą okolic, zamieszczone być nie mogły. W każdym razie sędzę, że nie bez korzyści byłoby ułożenie tabeli pojawów w ptasznictwie tatrzańskiem, a mam nadzieję, że gorliwy ornitolog p. KOCYAN, podający do pism obcych uwagi swe o przelotach ptaków z pojedynczych lat, niebawem tablicę taką ułoży.

Skrócenia użyte w tej rozprawce:

Jar.	—	Jarocki	Bech.	—	Bechstein,
Jun.	—	Jundził,	Besek.	—	Beseke,
Kl.	—	Kluk,	Breh.	—	Brehm,
Myśl. pt.	—	Myśliwstwo ptasze,	Brünn.	—	Brünnich,
Now.	—	Nowicki,	Briss.	—	Brisson,
Pietr.	—	Pietruski,	Cuv.	—	Cuvier,
Rzą.	—	Rzączyński,	Gmel.	—	Gmelin,
Sch.	—	Schauer,	Key. et Bla.	—	Keyserling et Blasius,
Tacz.	—	Taczanowski,	Lin.	—	Linné,
Tyz.	—	Tyzenhauz,	Leach.	—	Leach,
Wodz.	—	hr. Wodzicki,	Mey.	—	Meyer,
Zaw.	—	Zawacki,	Pall.	—	Pallas,
Dzied.	—	hr. Dzieduszycki,	Temm.	—	Temminck,
Gmin.	—	nazwa gminna.	Vieill.	—	Vieillot.

